

シミレーザー治療 について

深川ギャザリア皮膚科

東京都江東区木場 1-5-9

深川ギャザリアレガール棟 2F

TEL : 03-6458-7502

■Q スイッチレーザーの効果

短時間で高いエネルギーを与えることが可能で、レーザー光がシミやそばかすなどのメラニン色素の部分だけにダメージを与え、組織を破壊します。

1 回照射で完全には取り切れないこともあります。

その場合、再度レーザーを照射するか、美白剤だけで様子を見ます。

再度レーザー照射する場合は **2 か月以上空けて**の施術となります。

■施術前の注意事項

- 施術前にメイクや日焼け止めはしっかりと落とししてください。
- 日焼け直後や施術部位に傷がある場合は施術が行えません。
当日のお肌状態によっては施術をお断りする場合がございます。
- ピーリング剤やレチノール、ハイドロキノン、アダパレン、過酸化ベンゾイル製剤を使用されている方は施術 1 週間前から使用中止してください。
再開塗布は、刺激症状が消失かつ、施術後 1 週間経過してからとなります。
施術部位以外の使用は問題ありません。
- 他院を含め、3 か月以内に美容施術を受けた方は必ずお申し出ください。
- 隆起したホクロには照射できません。隆起していないホクロは照射可能ですが、照射後に薄くなる可能性があるため、消したくないホクロは事前にお申しつけください。

■施術中の注意事項

- 照射中は針で刺されるような痛みを感じることがあります。
痛みが強い場合はお申し付けください。

■施術後の経過と注意点

- 周囲の赤みとシミ部分が赤黒くなり、熱感と刺激感が出現してきます。
通常は数時間で刺激はおさまりますが、シミの部位は 1 週間から 10 日でかさぶたになります。かさぶたは無理に剥がさず、自然に剥がれるまでお待ちください。
- 施術後すぐに遮光テープと外用薬を塗布します。
外用薬は 3~5 日間、テープは最低 1 週間貼付となります。
- 施術直後メイクは可能ですが、摩擦を加えないため薄いメイクにしてください。
- シャワーは直後から可能ですが、入浴は翌日から可能となります。

■共通事項(施術部位に関して)

- 赤みや熱感が強い場合は、凍傷に注意して自宅でクーリングを行ってください。
- レーザー照射後は、施術部位を触るなどの刺激を加えると炎症が促進され、副作用が強くなる恐れがあります。
- 施術部位は日焼けによるダメージを受けやすくなります。日光の暴露を避け、日焼け止めの使用とテープ貼付をしてください。
- テープを剥がす際は、かさぶたを一緒に剥がさないように水分を加えながら剥がし、優しく洗ってください。
- 施術後 1 か月は照射部のピーリング、脱毛、IPL 等は避けてください。
- テープによる赤みや痒みがある場合は使用を中止してください。